Инструкция по применению
Солодки Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Кировская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Солодки корни
Количество в упаковке: 1



Описание

Густая жидкость коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Солодки корни

Состав

Состав на 100 г: Активный компонент: Солодки экстракт густой - 4 г (с содержанием глицирризиновой кислоты не менее 14 %) Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар белый) - 55 г Вода очищенная - 31 г Спирт этиловый (этанол) 90 % - 10 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в ½ стакана воды, 3 раза в день Детям до 2 лет - по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день Детям с 2 до 6 лет - по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день Детям с 6 до 12 лет - по 50 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом. При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. Дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции в отдельных случаях могут наблюдаться диспептические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена. Если при применении препарата возникли какие-либо нежелательные реакции, в том числе побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхо-легочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в одной чайной ложке препарата содержится 0,29 хлебных единиц (ХЕ), в 1 капле - 0,0024 ХЕ. Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,54 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза - 1,62 г абсолютного спирта, в 1 капле (для детей) - 0,0046 г абсолютного спирта. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.