Инструкция по применению
Солодки Сироп Флора Кавказа 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Солодки корни
Количество в упаковке: 1



Описание

Густая жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Солодки корни

Состав

Состав на 100 г Активный компонент: Солодки корней экстракт (Солодки экстракт густой) - 4 г. Вспомогательные вещества: Сахарный сироп* - 86 г Этанол (спирт этиловый) 95 %** - 9,2 г Вода очищенная - 0,8 г * Состав сиропа: сахарозы - 64 г, воды очищенной - 36 г. ** Используются фармацевтические субстанции, включенные в Государственный реестр лекарственных средств.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1 чайной ложке (предварительно разведенной в 1/2 стакана воды) 3 раза в день. Детям до 2 лет - по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день, детям с 2 до 6 лет - по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день, детям с 6 до 12 лет - по 50 капель (предварительно разведенных в 1/2 стакана воды) 3 раза в день. Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом. При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-электролитного обмена.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Информация для больных сахарным диабетом: в одной чайной ложке препарата содержится 0,35 хлебных единиц (ХЕ), 1 капле - 0,003 ХЕ. Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,24 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза - 0,73 г абсолютного спирта, в 1 капле (для детей) - 0,0054 г абсолютного спирта. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.