Инструкция по применению
Солодки Самарамедпром Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Солодки корни
Количество в упаковке: 1



Описание

Густоватая жидкость бурого цвета, своеобразного запаха, сладкого вкуса.

Действующее вещество

Солодки корни

Состав

Активное вещество: солодкового корня экстракт густой - 4 г, вспомогательные вещества: сахарный сироп (сахароза, вода) - 86 г, этанол (этиловый спирт) 95 % - 8,7 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом при наличии плохо отделяемого густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь взрослым по 1 чайной ложке, предварительно разведя в ½ стакана воды 3 раза в день. Детям до 2 лет –1-2 капли (предварительно разведя в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день. Детям с 2 до 6 лет 2-10 капель (предварительно разведя в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день. Детям с 6 до 12 лет – 50 капель (предварительно разведя в ¼ стакана воды) 3 раза в день. Детям старше 12 лет – ½ чайной ложки (предварительно разведя в ¼ стакана воды)3 раза в день. Курс лечения 7-10 дней. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом. При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (понос). При длительном применении препарата с превышением указанных дозировок возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков.

Передозировка

При применении препарата в дозах превышающих рекомендуемые возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.Не следует применять одновременно с препаратами содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 чайной ложке препарата содержится 011 хлебных единиц (ХЕ) в 1 капле - 001 ХЕМаксимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 043 г абсолютного спирта максимальная суточная доза - 14 г абсолютного спирта в 1 капле (для детей) - 0019 г абсолютного спирта. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора и т. п.).

Условия хранения

При температуре не выше 20 °С в защищенном от света месте.Хранить в недоступном для детей месте.