# Инструкция по применению
# Солодки Ярославская ФФ Сироп 100 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Солодки корни
Количество в упаковке: 1




## Описание

Густая жидкость коричневого цвета, своеобразного запаха.

## Действующее вещество

Солодки корни

## Состав

Активный компонент: Солодки экстракт густой 4 г Вспомогательные вещества: Сахарный сироп 86 г Этанол (этиловый спирт) 90% - 10г

## Форма выпуска

Сироп

## Показания

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии трудно отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

**Способ применения и дозы**

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в 1 /2 стакана воды, 3 раза в день. Детям до 2 лет - по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день. Детям с 2 до 6 лет - по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день. Детям с 6 до 12 лет по 50 капель (предварительно разведенных в 1/2 стакана воды) 3 раза в день. Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом. При наличии трудно отделяемой мокроты для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбация, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно- электролитного обмена.

**Передозировка**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолёгочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противо- кашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 чайной ложке препарата содержится 0,11 хлебных единиц (ХЕ), в 1 капле - 0,01 ХЕ. Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,49 г абсолютного спирта, для детей до 2 лет - 0,006 г, для детей от 2 до 6 лет - 0,03 г, для детей от 6 до 12 лет - 0,14 г, максимальная суточная доза для взрослых - 1,48 г абсолютного спирта, для детей до 2 лет - 0,02 г, для детей от 2 до 6 лет - 0,08 г, для детей от 6 до 12 лет - 0,42 г.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов дейтельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.