# Инструкция по применению
# Солпадеин Экспресс Таблетки растворимые 12 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Греция
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол+Кофеин
Количество в упаковке: 12

## Описание

Таблетки растворимые белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, гладкие, с фаской и риской на одной стороне.

## Действующее вещество

Парацетамол+Кофеин

## Состав

1 таблетка содержит:

## Форма выпуска

Таблетки

**Фармакокинетика**

Парацетамол быстро и практически полностью всасывается из ЖКТ, распределение в жидкостях организма относительно равномерно. Связывание парацетамола с белками плазмы минимально при терапевтической концентрации.Парацетамол метаболизируется в печени и выводится с мочой в виде глюкуронидных и сульфатных метаболитов - менее чем 5% выводится в неизмененном виде. T1/2 при приеме терапевтической дозы составляет 1-3 ч.Кофеин быстро всасывается из ЖКТ и распределяется по всему организму. Кофеин почти полностью метаболизируется в печени путем окисления и деметилирования в виде метаболитов, которые выводятся с мочой. T1/2 составляет 4-9 ч.

**Показания**

Болевой синдром (слабой и умеренной выраженности): головная боль, мигрень, оссалгия, миалгия, невралгия, артралгия, альгодисменорея, зубная боль. Симптоматическое лечение простудных заболеваний, гриппа, в т.ч. лихорадочный синдром.

**Способ применения и дозы**

Внутрь взрослым - по 2 таб. 4 раза/сут с интервалом не менее 4 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.Длительность применения - не более 10 дней.

**Противопоказания**

Тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, эпилепсия, артериальная гипертензия, глаукома, нарушения сна, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к компонентам комбинации.С осторожностьюДоброкачественные гипербилирубинемии (в т.ч. синдром Жильбера), вирусный гепатит, алкогольное поражение печени, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Не следует применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).При приеме кофеина существует высокий риск рождения ребенка с низкой массой тела, риск самопроизвольного аборта.Попадая в грудное молоко, кофеин может оказывать стимулирующее действие на ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

**Побочные действия**

Аллергические реакции (кожная сыпь, ангионевротический отек, крапивница), диспепсические расстройства (в т.ч. тошнота, эпигастральная боль).В редких случаях - гемолитическая анемия, тромбоцитопения.При длительном применении в больших дозах - гепатотоксичность, нефротоксичность, панцитопения.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Усиливает действие ингибиторов МАО.Снижает эффективность урикозурических лекарственных средств.Кофеин ускоряет всасывание эрготамина.Под воздействием парацетамола время выведения хлорамфеникола увеличивается в 5 раз.При длительном приеме парацетамол может усилить действие антикоагулянтов (производных дикумарина).Одновременный прием парацетамола и этанола повышает риск развития гепатотоксических эффектов и острого панкреатита.Барбитураты, фенитоин, этанол, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты и другие индукторы микросомального окисления увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, обусловливая возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках.Ингибиторы микросомального окисления (циметидин) снижают риск гепатотоксического действия.При одновременном применении метоклопрамид и домперидон увеличивают, а колестирамин снижает всасывание.

**Особые указания**

Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай) на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки.При длительном (более 1 нед.) лечении необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени. Без консультации врача принимают не более 3 дней при лечении лихорадочного синдрома и не более 5 дней - при болевом синдроме.Может изменить результаты анализов допинг-контроля спортсменов.Затрудняет постановку диагноза при симптомокомплексе "острый живот".У больных, страдающих атопической бронхиальной астмой, поллинозами, имеется повышенный риск развития аллергических реакций.Во время лечения следует отказаться от употребления этанола (повышение риска развития гепатотоксичности).

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.