Инструкция по применению
Соннован Таблетки покрытые оболочкой 3 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелатонин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3 мг

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклые с риской, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе - почти белого цвета.

Действующее вещество

Мелатонин

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: действующее вещество: мелатонин 3,00 мг; вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат 112,00 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 3,50 мг, магния стеарат 1,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая 40,00 мг; состав пленочной оболочки: Опадрай II белый 85F48105 5,00 мг, в том числе: поливиниловый спирт 2,345 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) 1,180 мг, тальк 0,870 мг, титана диоксид 0,605 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь быстро и полностью адсорбируется, легко проходит гистогематические барьеры, включая гематоэнцефалический барьер. Имеет короткий период полувыведения.

Показания

В качестве снотворного средства. В качестве адаптогена для нормализации биологических ритмов.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 3 мг за 30-40 минут перед сном, один раз в день. Как адаптоген при смене часовых поясов: за 1 день до перелета и в последующие 2-5 дней по 3 мг за 30-40 минут до сна. Максимальная суточная доза до 6 мг в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность, выраженное нарушение функции почек, аутоиммунные заболевания, лимфома, лейкоз, аллергические реакции, лимфогранулематоз, миелома, эпилепсия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции, головная боль, утренняя сонливость, тошнота, рвота, диарея, возможны отеки в первую неделю приема.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает эффект препаратов, угнетающих центральную нервную систему и бета-блокаторов. Не рекомендуется принимать совместно с гормональными лекарственными средствами. Несовместим с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), глюкокортикостероидами и циклоспорином.

Особые указания

В период применения препарата рекомендуется избегать пребывания на ярком свету. Необходимо проинформировать женщин, желающих забеременеть, о наличии у препарата слабого контрацептивного действия. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами В период лечения следует воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ?С во вторичной упаковке (пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте.