Инструкция по применению
Спаскупрель Таблетки подъязычные гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется при спазмах желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей, спазмов поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Citrullus colocynthis (Цитруллюс колоцинтис) D4 30 мг, Ammonium bromatum (Аммониум броматум) D4 30 мг, Atropinum sulfuricum (Атропинум сульфурикум) D6 30 мг, Veratrum album (Вератрум альбум) D6 30 мг, Magnesium phosphoricum (Магнезиум фосфорикум) D6 30 мг, Gelsemium sempervirens (Гельземиум семпервиренс) D6 30 мг, Passiflora incarnata (Пассифлора инкарната) D2 15 мг, Amanita muscaria (Аманита мускария) D4 15 мг, Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) D3 15 мг, Cuprum sulfuricum (Купрум сульфурикум) D6 15 мг, Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D6 60 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 302 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей), спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс терапии - 2-3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Условия хранения

В сухом месте