Инструкция по применению
Спазмонет Таблетки 40 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Дротаверин

Состав

1 таб. дротаверина гидрохлорид 40 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание: После приема внутрь абсорбция высокая. Биодоступность составляет 100%. Cmax в крови достигается через 2 ч. Распределение: Равномерно распределяется по тканям, проникает в гладкомышечные клетки. Связывание с белками плазмы крови - 80-90%. Не проникает через ГЭБ. Метаболизм и выведение: T1/2 - 7-12 ч. Дротаверин активно метаболизируется в печени, выводится в основном почками, в меньшей степени, с желчью.

Показания

При спазмах и болевом синдроме спастического характера, возникающих при следующих состояниях: — спазм гладких мышц внутренних органов (почечная колика, желчная колика, кишечная колика) — дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря по гиперкинетическому типу, холецистит, постхолецистэктомический синдром, пиелит — спастический запор, спастический колит, проктит, тенезмы — пилороспазм, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения, в составе комплексной терапии - для снятия болевого синдрома спастического характера) — эндартериит — спазм периферических, коронарных артерий, а также спазм церебральных артерий, сопровождающийся головными болями — альгодисменорея — для снижения возбудимости матки при беременности (угрожающий выкидыш, угрожающие преждевременные роды), спазм зева матки во время родов, затяжное раскрытие зева, послеродовые схватки. Для профилактики возникновения спазма при проведении некоторых инструментальных исследований, холецистографии.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая небольшим количеством жидкости. Детям в возрасте до 6 лет назначают по 10-20 мг 1-2 раза/сут, максимальная суточная доза - 120 мг; детям в возрасте от 6 до 12 лет - 1/2 таб. 2 раза/сут (20-40 мг), максимальная суточная доза - 200 мг; взрослым и детям старше 12 лет - по 1-2 таб. 3 раза/сут (120-240 мг).

Противопоказания

— выраженная печеночная недостаточность — выраженная почечная недостаточность — хроническая сердечная недостаточность — AV-блокада II и III степени — кардиогенный шок — артериальная гипотензия — повышенная чувствительность к компонентам препарата. Таблетки Спазмонет содержат лактозу, поэтому пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать препарат. С осторожностью следует назначать препарат детям в возрасте до 6 лет, при выраженном атеросклерозе коронарных артерий, закрытоугольной глаукоме, гиперплазии предстательной железы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Назначение препарата при беременности и в период лактации не противопоказано, однако следует применять с осторожностью, особенно в I триместре беременности.

Побочные действия

Возможны: тошнота, головокружение, сердцебиение, ощущение жара, повышенное потоотделение, снижение АД, аллергические кожные реакции.

Передозировка

Симптомы: в больших дозах дротаверин нарушает AV-проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении дротаверин может ослабить противопаркинсонический эффект леводопы. Усиливает действие папаверина, бендазола и других спазмолитиков (в т.ч. м-холиноблокаторов). При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами, хинидином и прокаинамидом усиливается гипотензивное действие. Фенобарбитал повышает выраженность спазмолитического действия дротаверина.

Особые указания

При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки препарат применяют в сочетании с другими противоязвенными средствами. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период применения препарата необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте