Инструкция по применению
Спигелон Таблетки гомеопатические 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 1 таб. Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6 30 мг Acidum arsenicosum (Arsenicum album) (ацидум арсеникозум (арсеникум альбум)) D6 30 мг Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D4 60 мг Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стрихнос нукс-вомика (нукс вомика)) D4 60 мг Carbo vegetabilis (карбо вегетабилис) D6 60 мг Stibium sulfuratum nigrum (стибиум сульфуратум нигрум) D6 60 мг Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

головная боль различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).

Способ применения и дозы

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения определяется врачом. Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

Противопоказания

детский возраст до 3-х лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Условия хранения

В сухом месте