Инструкция по применению
Спирамицин-веро таблетки 3 млн ме 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Спирамицин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 3000000 МЕ
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Спирамицин

Состав

Спирамицин 3 млн.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: острая внебольничная пневмония (в т.ч. атипичная, вызванная Mycoplasma, Chlamydia, Legionella), обострение хронического бронхита; синусит, тонзиллит, отит; остеомиелит, артрит; экстрагенитальный хламидиоз, простатит, уретриты различной этиологии; заболевания, передающиеся половым путем; инфекции кожи: рожа, инфицированные дерматозы, абсцесс, флегмоны (в т.ч. в стоматологии); токсоплазмоз, в т.ч. во время беременности; профилактика менингококкового менингита среди лиц, контактировавших с больными не более чем за 10 дней до его госпитализации; профилактика острого суставного ревматизма; лечение бактерионосительства возбудителей коклюша и дифтерии.

Способ применения и дозы

Спирамицин-веро принимают внутрь. Взрослым — 2-3 табл. по 3 млн МЕ (т.е. 6-9 млн МЕ) в день за 2 или 3 приема. Максимальная суточная доза — 9 млн МЕ. Профилактика менингококкового менингита — 3 млн. МЕ за 12 ч в течение 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к спирамицину и другим компонентам Спирамицин-веро; период грудного вскармливания; детский возраст (таблетки по 3 млн МЕ у детей не применяются); не рекомендуется использование спирамицина у больных с дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, ввиду возможного возникновения острого гемолиза.

Побочные действия

Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея и очень редкие случаи возникновения псевдомембранозного колита (менее 0,01%). Описаны единичные случаи язвенного эзофагита и острого колита. Отмечена также возможность развития острого повреждения слизистой оболочки кишечника у пациентов со СПИДом при применении высоких доз спирамицина по поводу криптоспоридиоза. Со стороны периферической системы и ЦНС: преходящие парестезии. Со стороны печени: в очень редких случаях (менее 0,01%) — изменения функциональных проб печени и развитие холестатического гепатита. Со стороны органов кроветворения: очень редкие случаи (менее 0,01%) развития острого гемолиза и тромбоцитопении. Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно удлинение интервала QT на электрокардиограмме. Реакции гиперчувствительности: сыпь на коже, крапивница, кожный зуд. Очень редко (менее 0,01%) — ангионевротический отек, анафилактический шок.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении