Инструкция по применению
Спрегаль аэрозоль 152г

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Франция
Производитель: Омега Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиперонил бутоксид+Эсбиол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Пиперонил бутоксид+Эсбиол

Состав

10 г содержит:эсдепаллетрин (эсбиол) 66 мг, пиперонила бутоксид 531 мг. Вспомогательные вещества: этанол 96%, макроглицериды, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, пропеллент HFA 134a.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Компоненты, входящие в состав препарата, обнаруживаются в крови пациента через 1 ч после наружного применения Спрегаля. Cmax эсдепаллетрина достигается через 1 ч после применения препарата; Cmax пиперонила бутоксида - через 2 ч после применения. Через 24 ч после применения препарата концентрация его компонентов в плазме крови минимальна, а в некоторых случаях не определяется. Через 48 ч после применения Спрегаля никаких следов его компонентов в плазме крови пациента не обнаруживается.

Показания

Лечение чесотки

Противопоказания

— бронхиальная астма;— обструктивный бронхит;— лактация (грудное вскармливание);— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью назначают препарат при беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности возможно только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.При необходимости применения препарата в период лактации следует отказаться от грудного вскармливания на период лечения.

Побочные действия

Местные реакции: возможно появление ощущения легкого жжения, которое обычно быстро проходит.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Спрегаль не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Спрегаль неизвестно.

Особые указания

Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении.Одного баллона препарата Спрегаль достаточно для лечения 3-4 человек.Необходимо избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза следует тщательно промыть их теплой водой.Во избежание вторичного заражения необходимо обработать постель и одежду.Препарат противопоказан при бронхиальной астме, обструктивном бронхите только из-за аэрозольной формы. В этом случае возможно нанесение препарата на кожу ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

Условия хранения

При комнатной температуре