Инструкция по применению
Стабломакс Капли глазные 0,1% 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Индия
Производитель: ИПКА ЛАБ.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Олопатадин
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачный раствор от бесцветного до жёлтого цвета.

Действующее вещество

Олопатадин

Состав

Препарат Стабломакс содержит: Действующим веществом является олопатадин. Каждый мл раствора содержит 1 мг олопатадина (в виде гидрохлорида). Прочими вспомогательными веществами являются: бензалкония хлорид раствор 50%, натрия хлорид, динатрия гидрофосфат безводный, вода для инъекций, соляная кислота, гидроксид натрия пеллеты. Препарат Стабломакс содержит бензалкония хлорид (см. раздел 2).

Форма выпуска

Капли

Показания

Препарат Стабломакс показан к применению у детей с 3 лет и взрослых для лечения симптомов сезонного аллергического конъюнктивита.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза составляет одну каплю препарата в глаз или глаза два раза в сутки, утром и вечером. Применение у детей Препарат можно применять у детей в возрасте от трех лет и старше в той же дозе, что и у взрослых. Безопасность и эффективность олопатадина у детей в возрасте до 3 лет не установлены.

Противопоказания

Не применяйте препарат Стабломакс:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не применяйте олопатадин в период грудного вскармливания.

Передозировка

Если Вы применили препарат Стабломакс больше, чем следовало Промойте глаза тёплой водой. Не закапывайте капли, пока не наступит время для следующего запланированного закапывания. Отсутствуют сведения о развитии токсических явлений при случайном введении избыточного количества препарата в конъюнктивальную полость или при случайном проглатывании. Если Вы забыли применить препарат Стабломакс Используйте одну каплю, как только вспомните, а затем вернитесь к своему обычному режиму дозирования. Однако, если уже почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу, прежде чем вернуться к своему обычному режиму дозирования. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы прекратили применение препарата Стабломакс Не прекращайте применение препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Если Вы применяете другие глазные капли или мази для глаз, выдерживайте интервал не менее 5 минут между применением каждого из препаратов. Глазные мази следует применять в последнюю очередь.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °С. Используйте препарат в течение 28 дней после первого вскрытия флакона, после его необходимо выбросить и начать пользоваться новым. Запишите дату открытия флакона в отведённом месте на этикетке флакона и внешней картонной упаковке. Для предотвращения возможности развития инфекции через 4 недели после первого вскрытия флакона его необходимо выбросить и начать пользоваться новым. Запишите дату открытия флакона в отведённом месте на этикетке флакона и внешней картонной упаковке.