Инструкция по применению
Стелланин Мазь 3 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Фармпрепарат
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диэтилбензимидазолия трийодид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Диэтилбензимидазолия трийодид

Состав

Мазь для наружного применения 3% 100 г диэтилбензимидазолия трийодид 3 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Системное всасывание действующего вещества отсутствует даже при поврежденной коже, тем не менее, в ране присутствуют терапевтические концентрации препарата.

Показания

Для мази — трофические язвы нижних конечностей; — пролежни; — ожоги I и II степени; — ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы, в т.ч. после укусов насекомых; — дополнительное лечение асептических послеоперационных ран (после иссечения, коагуляции, эпизиотомии, для лечения трещин на коже, ран и швов); — ускорение приживления кожного трансплантанта.

Способ применения и дозы

Мазь Препарат наносят на поврежденную поверхность кожи так, чтобы участок кожи был покрыт препаратом полностью. Продолжительность и кратность нанесения препарата зависит от тяжести заболевания и локализации процесса. Суточная доза не должна превышать 10 г. Возможно использование окклюзионных повязок и пластыря. При лечении гранулирующих ожогов, ран и трофических язв со слабой экссудацией препарат наносят равномерным слоем толщиной 1-1.5 мм таким образом, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта мазью, и накладывают стерильную марлевую повязку. Смену повязок проводят 1 раз в 1-2 сут при лечении ожогов и 1-2 раз/сут при лечении ран и трофических язв. При открытом способе лечения ожогов препарат наносят 1-2 раза/сут. Продолжительность лечения определяется динамикой эпителизации ран. При незначительных повреждениях кожи (ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы) препарат наносят тонким слоем на пораженную поверхность 2 раза/сут.

Противопоказания

— Тиреотоксикоз; — аденома щитовидной железы; — острая почечная недостаточность; — одновременная терапия радиоактивным йодом; — дети до 18 лет; — I триместр беременности; — повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан в I триместре беременности. С осторожностью: II и III триместры беременности, период лактации.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции (зуд, гиперемия кожи), при появлении которых следует прекратить применение препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять препарат в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества. В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшиться.

Особые указания

Мазь нельзя наносить на слизистые оболочки. При попадании препарата в глаза или на слизистую оболочку необходимо промыть теплой водой.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении