Инструкция по применению
Стелланин-ПЭГ Мазь 3 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Фармпрепарат
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диэтилбензимидазолия трийодид
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Диэтилбензимидазолия трийодид

Состав

100 г мази для наружного применения содержит: Активное вещество: 1,3-диэтилбензимидазолия трийодида - 3,0 г; Вспомогательные вещества: повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный), димексид, полиэтиленоксид 1500 (полиэтиленгликоль 1500), полиэтиленоксид 400 (полиэтиленгликоль 400).

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Системное всасывание действующего вещества отсутствует даже при поврежденной коже, тем не менее, в ране присутствуют терапевтические концентрации препарата.

Показания

Лечение острых гнойных процессов (ран) кожи и мягких тканей (фурункулы, карбункулы, гидроадениты, флегмоны, абсцессы); дополнительное лечение гнойных осложнений послеоперационных ран (после иссечения, коагуляции, эпизиотомии, для лечения трещин на коже, ран и швов); термические поражения кожи и мягких тканей I-III степеней, осложненные инфекционным процессом; трофические язвы, пролежни, осложненные инфекционным процессом. ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем около 1.5-2 мм непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или препарат наносят на перевязочный материал, а затем на рану. Слой мази должен превосходить по окружности размеры раны не менее чем на 5 мм. Тампонами, пропитанными мазью, рыхло заполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с препаратом вводят в свищевые ходы. При локализации раны на неудобном для бинтования месте допустимо использование лейкопластырной или клеевой повязки. Смену повязок проводят 1-2 раза в сутки. Суточная доза не должна превышать 10 г. Длительность лечения в среднем составляет 5 - 15 дней. При незначительных повреждениях кожи (ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы) препарат наносят тонким слоем на пораженную поверхность 2 раза в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата Стелланин-ПЭГ, тиреотоксикоз, аденома щитовидной железы, тяжелая почечная недостаточность, одновременная терапия радиоактивным йодом, дети до 18 лет, I триместр беременности. С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Запрещено принимать препарат Стелланин-ПЭГ в I триместр беременности. С осторожностью принимать в II и III триместры беременности и в период лактации.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции (зуд, гиперемия кожи), при появлении которых следует прекратить применение препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При случайном приёме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять препарат Стелланин-ПЭГ в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.

Особые указания

Избегать попадания мази в глаза. При попадании препарата в глаза необходимо промыть теплой водой.

Срок хранения после открытия

2 года.

Условия хранения

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 0-25 °C.   Хранить в недоступном для детей месте.