Инструкция по применению
Стевия Плюс Таблетки 100 мг 150 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фарминдустрия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 150
Срок годности: 24



Описание

«Стевия плюс» - натуральный сахарозаменитель. Таблетки цвета топленого молока по 100 мг. Входящие в состав таблеток «Стевия плюс» цикорий, стевиозид, глицирризиновая кислота и витамин С регулируют углеводный обмен, снижают уровень глюкозы и холестерина в крови, нормализуют артериальное давление, способствуют росту полезной микрофлоры кишечника, выводят из организма токсины. Экстракт цикория - инулин - является источником органического кремния, который улучшает эластичность сосудов, укрепляет ногти и волосы. Благодаря растворимым волокнам цикория нормализуется кишечная микрофлора и как следствие - укрепляется иммунитет. Экстракт Стевии обладая сладким вкусом не содержит калорий, нормализует уровень сахара и холестерина в крови, снижает до нормы давление, препятствует росту патогенной флоры и как следствие - профилактика кариеса, повышает эластичность сосудов. Экстракт корня Солодки содержит глицирризиновую кислоту, оказывающую противовирусное и противовоспалительное действие, стимулирует выработку собственного инсулина при сахарном диабете, оказывает благотворное действие на слизистые оболочки. Витамин С является незаменимым фактором питания, так как организм человека не способен синтезировать аскорбиновую кислоту. Установлено участие витамина С в метаболизме аминокислот, в транспорте кислорода, в повышении иммунологической реактивности организма; аскорбиновая кислота оказывает влияние на активность ферментов, обеспечивает нормальную проницаемость стенок сосудов, стимулирует антитоксическую функцию печени.

Состав

Экстракт Цикория, экстракт Стевии, экстракт корня Солодки, витамин С.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника глицирризиновой кислоты и растворимых пищевых волокон (инулина), дополнительного источника витамина С, содержащей стевиозиды.

Способ применения и дозы

Взрослым по 4-5 таблеток 3 раза в день во время приема пищи, растворив в чае, кофе или других напитках. Длительность приема 2 месяца. При необходимости через 10 дней прием можно повторить.

Противопоказания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, беременности и кормлении грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

При комнатной температуре