Инструкция по применению
Стим Таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника пребиотиков (инулина и олигофруктозы), содержит лактат кальция в качестве метабиотика. Пребиотики – пищевые ингредиенты, обеспечивающие благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и /или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. Ферментация инулина и олигофруктозы в толстой кишке приводит к большому количеству благоприятных эффектов: • стимулирует увеличение количества собственной микробиоты кишки, • уменьшает время транзита по желудочно-кишечному тракту, • способствует увеличению массы фекалий. Увеличение количества собственных кишечных бактерий оказывает положительный эффект за счет выработки компонентов, ингибирующих потенциальные патогены, продукции витаминов и пищеварительных ферментов. Лактат кальция, являясь производным молочной кислоты, вырабатываемой собственной микрофлорой кишки, дополнительно создает условия для ее защиты. Имеются данные, что лактат кальция способствует эрадикации бактерии H.pylori. Таким образом биологически активная добавка СТИМ является метапребиотиком, так как в составе имеются пребиотики инулин и олигофруктоза, стимулирующие рост собственной микробиоты, и метабиотик лактат кальция, дополнительно ее защищающий. Нарушение состава собственной микробиоты кишки может наблюдаться при различных состояниях: изменении режима питания, приеме различных лекарственных препаратов, включая лечение антибиотиками, диарее, запорах и т.п. В связи с этим СТИМ в первую очередь рекомендуется: • для нормализации качественного и количественного состава собственной микрофлоры кишки в результате приема лекарственных средств (включая антибиотики и другие противомикробные средства), после перенесенных кишечных инфекций, • при функциональных нарушениях желудочного-кишечного тракта: диарее, неустойчивом стуле, метеоризме и т.п., • при резком изменении характера питания (в путешествиях), • при хеликобактериозе. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Условия реализации: аптечная сеть, специализированные магазины, отделы торговой сети. Срок годности: 3 года Свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.11.003.E.002741.07.18 от 02.07.2018 г.

Состав

Таблетки массой 710,5 мг 60 таблеток, покрытых оболочкой. Олигофруктоза, лактат кальция, инулин, дикрахмалфосфат ацетилированный, пленочное покрытие, диоксид кремния, стеарат магния

Форма выпуска

Таблетки

Показания

для нормализации качественного и количественного состава собственной микрофлоры кишки в результате приема лекарственных средств (включая антибиотики и другие противомикробные средства), после перенесенных кишечных инфекций; при функциональных нарушениях желудочного-кишечного тракта: диарее, неустойчивом стуле, метеоризме и т.п.; при резком изменении характера питания (в путешествиях); при хеликобактериозе.

Способ применения и дозы

Детям с 7 до 14 лет по 1 таблетке 3 раза в день; детям старше 14 лет по 1-2 таблетки 3 раза в день; взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность приема 14 дней. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.