Инструкция по применению
Стимбифид Плюс Таблетки 500 мг 170 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 170



Описание

Микробиота кишечника здорового человека на 90% состоит из бифидобактерий - микроорганизмов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Неправильное питание, вредные привычки, неблагоприятное воздействие окружающей среды, использование антибиотиков снижают количество бифидобактерий в кишечнике, а их место немедленно занимают патогенные, вредные для человека микробы. Это нарушение биологического равновесия между условно-патогенной и полезной микробиотой называется дисбактериозом, что приводит к существенному снижению колонизационной резистентности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. К сожалению, в настоящее время около 95% населения России страдает дисбактериозом кишечника. При этом клинико-лабораторном синдроме нарушается нормальное пищеварение, появляются диарея или запоры, спастические боли в области живота, повышенное газообразование, аллергические реакции. В дальнейшем это состояние ведет к ухудшению работы печени, поджелудочной железы, снижению иммунитета, трамбообразованию, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и другим патологиям. Стимбифид выпускается в виде таблеток плоско-овальной формы белого цвета массой 500 мг. Описание состава и действия: Метапребиотик СТИМБИФИД ПЛЮС является инновационной разработкой российских ученых Научного общества «Микробиота» на основе глубоких фундаментальных исследований кишечной микробиоты, а также безопасных и эффективных методов ее коррекции. Исследования легли в основу «Научного открытия» и защищены двумя патентами Российской Федерации. Метапребиотик СТИМБИФИД ПЛЮС восстанавливает индивидуальную микробиоту кишечника, создавая приоритетные условия для размножения бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки, которые, угнетая рост патогенной микробиоты, вытесняют ее из организма. Существенный рост нормобиоты приводит к повышению колонизационной резистентности слизистой оболочки ЖКТ. Метапребиотик СТИМБИФИД ПЛЮС является дальнейшим развитием и глубокой оптимизацией пребиотикаСтимбифид и состоит из двух компонентов - пребиотического и метабиотического. Узконаправленный пребиотический компонент - природные фруктоолигосахариды (ФОС) и фруктополисахариды (ФПС) с оптимизированным соотношением коротких (GFn, n=2-8) и длинных (GFn, n=2-60) цепочек, что обеспечивает снижение бифидобактерий эксклюзивным питанием по всей длине толстой кишки. Метабиотический компонент- лактат кальция. Является мощным стимулятором роста и размножения нормобиоты (патенты РФ).

Состав

Состав 1 таблетки Стимбифида плюс 1. Олигофруктоза P95 (фруктоолигосахариды) - 270 мг, 2. Инулин GR (фруктополисахариды) - 116 мг, 3. Лактат кальция - 104 мг, 4. Вспомогательные вещества для формирования таблетки - диоксид кремния и стеарат кальция в сумме - 10 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Сочетание в СТИМБИФИД ПЛЮСЕ одновременно метабиотика и пребиотика с различными механизмами действия способствует: безопасному и эффективному восстановлению собственной (индивидуальной)микробиоты кишечника, в том числе при одновременном приеме антибиотиков, повышению колонизационной резистентности слизистой оболочки ЖКТ при инфекционной патологии, - эрадикации Helicobacterpylori, устранению запоров (эффект диетического/пищевого волокна).

Способ применения и дозы

- Взрослым и детям с 14 лет по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Количество курсов не ограничено, - Детям от 3-х лет по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. С целью адаптации желудочно-кишечного тракта к фруктосахаридам возможно плавное увеличение суточной дозы до рекомендуемой в течение 2-х, 3-х суток. Так, например, для взрослых и детей (с 14 лет) в первый и второй день - по 1 таблетке 3 раза в день, в третий - по 2 таблетки 3 раза в день (полная суточная дозировка). Аналогично для других возрастных групп.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.