Инструкция по применению
Стимбифид Таблетки 80 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 80
Срок годности: 24.0



Описание

Стимбифид восстанавливает нормальную микрофлору кишечника, создавая приоритетные условия для размножения бифидобактерий, которые, угнетая рост патогенной микрофлоры, вытесняют её из организма. Входящие в состав СТИМБИФИДа Рафтилин и Рафтилоза представляют собой высокоочищенные природные фруктоолигосахаридные и фруктополисахаридные волокна (Бельгия). Именно они и формируют благоприятные условия в кишечнике, при которых размножаются бифидобактерии. Растительные волокна - фруктополисахариды (инулин) и получаемые на их основе фруктоолигосахариды (олигофруктоза) содержатся во многих фруктовых и овощных культурах, и, таким образом входят в наш повседневный рацион на протяжении многих столетий. Они не перевариваются в желудке и тонком кишечнике и доходят до толстого кишечника в практически неизменном виде, где они селективно стимулируют рост полезных бифидобактерий.   Таким образом, инулин и олигофруктоза являются эксклюзивным питанием для бифидобактерий – основного компонента облигатной микрофлоры кишечника.] Специально разработанная формула Стимбифида, содержащего уникальную композицию длинных (GFn, n=2-60) и коротких цепочек (GFn, n=2-8) фруктосахаридов, обеспечивает снабжение бифидобактерий эксклюзивным питанием по всей длине толстого кишечника, что обеспечивает: Несомненно, используемые в нем витамины и минералы важны как для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и повышения иммунного статуса, так и для организма в целом:

Состав

1 таблетка содержит: витамины группы B, E, PP, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, витамин C, биотин, цинк, селен, инулин и олигофруктозу.

Форма выпуска

Таблетки

Способ применения и дозы

Взрослым БАД «Стимбифид» рекомендуется принимать по 2-3 таблетке 3 раза в день во время еды. Детям в возрасте от 5 до 10 лет рекомендуется принимать по 2 таблетке 3 раза в день во время еды. Детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Детям в возрасте от 0,5 лет до 2 лет - по 0,5 таблетке 3 раза в день во время еды (для малышей этого возраста таблетку «Стимбифида» можно в измельченном виде добавлять в каши и молочно-кислые продукты).
Продолжительность курса приема – 1 месяц. Перерыв между курсами приема БАД «Стимбифид» должен составлять не менее 2-х-3-х недель. Для лучшей адаптации пищеварительной системы к содержащимся в составе БАД «Стимбифид» инулину и олигофруктозе рекомендуется плавно наращивать суточную дозу «Стимбифида» в течение 3-х суток (например, взрослым рекомендуется принимать: в первый день – по 1 таблетке 3 раза в день, во второй день - по 2 таблетке 3 раза в день, в третий день – по 3 таблетке 3 раза в день). Аналогичная адаптивная схема приема «Стимбифида» рекомендуется и для других возрастных групп.

Противопоказания

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов Стимбифида.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом

Условия хранения

В сухом месте