Инструкция по применению
Стоматидин Раствор для местного применения 0,1 % 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для наружного применения
Страна: Босния и Герцеговина
Производитель: Босналек
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гексэтидин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 2.0



Описание

Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии.

Действующее вещество

Гексэтидин

Состав

Активное вещество гексэтидин. Вспомогательные вещества пропиленгликоль - 100 мг, полисорбат 20 - 10 мг, лимонной кислоты моногидрат - 0.4 мг, натрия сахаринат - 0.3 мг, рацементол - 0.15 мг, метилсалицилат - 0.1 мг, краситель азорубин - 0.1 мг, этанол 96% - 0.1 мл, вода - до 1 мл. 200 мл - флаконы темного стекла (1) с алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия - пачки картонные.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения

Фармакокинетика

Гексэтидин хорошо адгезируется на слизистой оболочке и практически не всасывается. После однократного применения гексэтидин обнаруживается на слизистой оболочке полости рта в течение 65 часов. В зубных бляшках активные концентрации сохраняются в течение 10-14 часов после применения.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки тонзиллиты (ангина с поражением боковых валиков, ангина Плаута-Венсана), фарингит, гингивит, кровоточивость десен, периодонтопатии, стоматит, глоссит, афтозные язвы с целью профилактики суперинфекции, с целью профилактики инфицирования альвеол после удаления зубов, грибковые инфекции полости рта и глотки (особенно кандидозный стоматит), до и после операций в полости рта и глотки, дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях, с целью устранения неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей полости рта и глотки.

Способ применения и дозы

Для полоскания необходимо всегда использовать неразведенный препарат. Раствор нельзя проглатывать. Необходимо выплюнуть раствор после полоскания. При заболеваниях полости рта у взрослых и детей в возрасте старше 5 лет следует полоскать полость рта неразведенным раствором препарата в количестве 10-15 мл (1 столовая ложка) в течение 30 сек. При заболеваниях глотки (горла) у взрослых и детей в возрасте старше 5 лет применяют полоскания неразведенным раствором препарата в количестве 10-15 мл в течение 30 сек. При лечении заболеваний полости рта препарат можно наносить с помощью тампона. Применяют 2 раза в сутки (предпочтительно утром и вечером), после приема пищи. Длительность применения препарата устанавливается индивидуально. Если симптомы заболевания не исчезают после 5 дней применения препарата и/или сопровождаются повышенной температурой, пациент должен обратиться к врачу.

Противопоказания

Атрофический фарингит, детский возраст до 5 лет, I триместр беременности, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о проникновении гексэтидина через плацентарный барьер и о выделении с грудным молоком недостаточно. Применение препарата в I триместре беременности противопоказано. Возможно использование препарата во II и III триместрах беременности, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Местные реакции жжение, раздражение и умеренная сухость слизистой оболочки полости рта. Прочие аллергические реакции при длительном применении возможно изменение вкусовых ощущений. После прекращения применения препарата побочные эффекты исчезают.

Передозировка

При случайном проглатывании больших количеств препарата возможно появление тошноты и рвоты. Лечение промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

Особые указания

Не использовать препарат у категории пациентов, которые самостоятельно не могут проводить данную процедуру (полоскание). Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат содержит 10% этанола (спирта этилового 96%). Препарат следует принимать не позднее, чем за 30 мин до начала управления транспортным средством.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, беречь от детей.