Инструкция по применению
Стоматофит Экстракт жидкий флакон 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Экстракт
Страна: Польша
Производитель: Красногорсклексредства
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения возможно образование небольшого помутнения и осадка.

Состав

Для получения 100 г препарата необходимо:Активные компаненты:ромашки аптечной цветки -13,0 г,дуба коры - 13,0 г,шалфея лекарственного листья - 13,0 г,арники трава - 6,5 г,аира обыкновенного корневища - 6,5 г,мяты перечной трава - 6,5 г,тимьяна трава- 6,5 г.вспомогательное вещество:этанол (спирт этиловый) 70% - достаточное количество для получения 100 г препарата.

Форма выпуска

Экстракт

Показания

Применяют для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (в том числе стоматит, гингивит, пародонтит).

Способ применения и дозы

Местно. Перед применением препарата рекомендуется почистить зубы или удалить остатки пищи полосканием водой. 7,5 мл препарата развести в 50 мл (1/4 стакана) теплой кипяченой воды. Полученный раствор использовать для полосканий полости рта. Процедуру повторять 3-4 раза в день. Курс лечения — 10-15 дней. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом. Для дозирования использовать мерный стаканчик, вложенный в упаковку.Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и не полоскать полость рта в течение 15-20 минут.Перед применением взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим растениям семейств Астровые и Яснотковые, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием клинических данных по эффективности и безопасности).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания,в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.Возможно незначительное окрашивание зубов и слизистой оболочки полости рта,которое устраняется при ежедневной их чистке.Если у Вас отмечаются побочные эффекты,указанные в инструкции,или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты,не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки при применении препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Препарат содержит 60 - 70% этанола (спирта этилового).В разовой дозе водного раствора,полученного путем разведения 7,5 мл препарата в 50 мл (1/4 стакана) теплой кипяченой воды,содержится до 4,1 г абсолютного этилового спирта,в суточной дозе раствора (3-4 разовые дозы) содержится до 12,4-16,6 г абсолютного этилового спирта.Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 7 дней или ухудшаются,следует обратится к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности,требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами,работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении