Инструкция по применению
Стопангин Раствор наружный 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Чехия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гексэтидин
Количество в упаковке: 1



Описание

Раствор для местного применения Стопангин - антисептик для местного применения в стоматологии и ЛОР-практике. Обладает также противогрибковой активностью и анальгезирующим действием при нанесении на слизистую оболочку. Кроме того, Стопангин оказывает обволакивающее действие. Длительность действия - 10-12 ч.

Действующее вещество

Гексэтидин

Состав

Активное вещество: гексэтидин. Вспомогательные вещества: метилсалицилат, эфирное масло мяты перечной, масло цветков гвоздики, анисовое эфирное масло, эвкалиптовое эфирное масло, сассафрасное эфирное масло, левоментол, моногидрат сахарината натрия, моногидрат лимонной кислоты, краситель пунцовый (Понсо R), полисорбат, этанол 96%, вода очищенная.

Форма выпуска

Раствор

Показания

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани (тонзиллит, в т.ч. ангина Венсана, фарингит, стоматит, афтозные язвы полости рта, глоссит, периодонтит, кровоточивость десен),— грибковые заболевания (кандидоз) полости рта и гортани до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани,— травмы полости рта и гортани,— профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба,— гигиена полости рта для устранения неприятного запаха изо рта (дезодорирующее средство),— профилактика суперинфекции при разрушающих опухолях полости рта и гортани.

Способ применения и дозы

Раствор применяют неразбавленным для полоскания полости рта - 10-15 мл (1 десертная или столовая ложка) в течение не менее 30 сек 2 раза/сут. Можно также смазывать слизистую оболочку полости рта с помощью ватного тампона на палочке. Этот способ применения целесообразно использовать у детей.Раствор следует применять после еды или в промежутках между приемами пищи.Длительность лечения препаратом Стопангин составляет 5-7 дней.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению в I триместре беременности.Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможно ощущение жжения слизистой оболочки полости рта (быстро самопроизвольно проходит). В исключительных случаях у пациентов с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, при случайном проглатывании препарата при полоскании возможна тошнота (проходит самопроизвольно).В случае появления необычных реакций пациент должен посоветоваться с врачом о целесообразность дальнейшего применения препарата.

Особые указания

Противопоказания: атрофический фарингит, повышенная чувствительность к компонентам препарата.