Инструкция по применению
Стопдиар Таблетки 100 мг 24 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

Препарат Стопдиар содержит: Действующим веществом является нифуроксазид. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 100 мг нифуроксазида. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный, желатин, тальк, магния стеарат. Оболочка таблетки: гипромеллоза, титана диоксид, тальк, макрогол-20000, краситель хинолиновый желтый (Е 104).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Стопдиар применяется для лечения острой бактериальной диареи, протекающей без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации, у взрослых и детей в возрасте старше 3 лет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Взрослые: 200 мг (2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 100 мг) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч). Применение у детей и подростков Дети в возрасте от 3 до 6 лет: 200 мг (2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 100 мг) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч). Дети в возрасте от 6 до 18 лет: 200 мг (2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 100 мг) 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 ч). Путь и (или) способ введения Для приема внутрь. Продолжительность терапии Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Если Вы забыли принять препарат Стопдиар Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение в течение первых 3 дней приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте или не давайте ребенку препарат Стопдиар: если у Вас или у Вашего ребенка аллергия на нифуроксазид, производные нитрофурана или любые другие компоненты препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В качестве меры предосторожности не принимайте препарат Стопдиар, если Вы беременны или кормите грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Стопдиар может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Стопдиар и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции: отек лица, губ, языка и/или горла, которые могут сопровождаться затруднением дыхания или глотания (признаки отека Квинке), резкое снижение артериального давления, затруднение дыхания, крапивница, зуд, отек кожи и/или слизистых, побледнение или покраснение кожных покровов, головокружение, обморочные состояния, тошнота и рвота (признаки анафилактического шока), кожная сыпь, крапивница.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Стопдиар больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Стопдиар больше, чем следовало, обратитесь к врачу. Признаки передозировки неизвестны, Вам может потребоваться медицинская помощь. В случае передозировки лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Не принимайте препарат Стопдиар вместе с препаратами, вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций, лекарственными препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы. Препарат Стопдиар с пищей, напитками и алкоголем Употребление алкоголя во время приема препарата Стопдиар запрещается, поскольку может вызвать острые и тяжелые реакции непереносимости (так называемые дисульфирамоподобные реакции).

Особые указания

Перед приемом препарата Стопдиар проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. При лечении диареи важно употреблять большое количество жидкости для восполнения потери жидкости (среднее суточное потребление воды для взрослого составляет 2 литра). В случае тяжелой и длительной диареи, сильной рвоте или анорексии, обратитесь к врачу. Возможно Вам потребуется восполнение потери жидкости внутривенно. Сообщите врачу, если Вы почувствуете ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции. Вам может потребоваться применение антибактериальных препаратов системного действия. В случае возникновения симптомов аллергии, таких как одышка, сыпь, кожный зуд, немедленно прекратите прием препарата и обратитесь за медицинской помощью. Употребление алкоголя во время лечения препаратом Стопдиар запрещено. В качестве меры предосторожности препарат Стопдиар не следует принимать во время беременности и кормления грудью. Дети и подростки Препарат Стопдиар не предназначен для применения у детей до 3 лет (для данной лекарственной формы). Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Если состояние не улучшается или оно ухудшается в течение 3 дней приема препарата, Вам следует обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.