Инструкция по применению
Стоптуссин Фито Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Чехия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Подорожника ланцетовидного листьев экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт+Тимьяна ползучего травы экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48

Действующее вещество

Подорожника ланцетовидного листьев экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт+Тимьяна ползучего травы экстракт

Состав

Активные компоненты: тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий спиртовой (Thymi extractum fluidum ethanolum) 4,1624 г, тимьяна ползучего травы экстракт жидкий спиртовой (Serpylli extractum fluidum ethanolum) 4,1630 г, подорожника ланцетовидного листьев экстракт жидкий спиртовой (Plantaginis extractum fluidum ethanolum) 4,1666 г вспомогательные вещества: мед 22,5000 г, натрия бензоат 0,1250 г, сахароза 62,0000 г, глицерол 85 % 0,0078 г, вода до 100,0000 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). Детям от 1 года до 4 лет можно принимать препарат только по рекомендации врача. Детям от 1 года до 4 лет - по ½ чайной ложки (1 чайная ложка=5 мл) 3 раза в день, от 4 до   12 лет - по 1–2 чайные ложки (1 чайная ложка=5 мл) 3 раза в день, подросткам от 12 лет, взрослым и пожилым - 1 столовая ложка (1 столовая ложка=15 мл) 3-4 раза в день (не более 4 раз в день). Без назначения врача курс лечения - не более 10 дней. В случае отсутствия улучшения в течение 5 дней у взрослых или 3 дней у детей либо в случае ухудшения обратитесь за консультацией к врачу. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата у пациентов с известной непереносимостью меда и продуктов пчеловодства повышенная чувствительность к растениям семейства яснотковых (Lamiaceae) хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации) заболевания печени и почек врожденная непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция дефицит сахаразы/изомальтазы беременность период грудного вскармливания детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточных сведений о влиянии препарата на беременных нет. Неизвестно, поступают ли компоненты препарата Стоптуссин ФИТО в материнское молоко. Исходя из недостаточных сведений, применять препарат в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Нежелательные реакции систематизированы в соответствии с Классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): частота неизвестна (невозможно определить, исходя из доступных данных). Аллергические реакции: частота неизвестна - диспноэ, кожная сыпь, крапивница, а также отек лица, полости рта или горла (отек Квинке). Нарушения со стороны пищеварительной системы: частота неизвестна - спазмы, тошнота, рвота. В этих случаях, а также в случае развития каких-либо нежелательных явлений, не указанных в инструкции, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало.

Взаимодействие с другими препаратами

Стоптуссин-Фито не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

В случае если улучшения состояния пациента не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры тела, следует немедленно обратиться к врачу. В составе препарата Стоптуссин ФИТО содержится 62% сахарозы, поэтому его следует с осторожностью применять у пациентов с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. В 1 чайной ложке препарата Стоптуссин ФИТО содержится до 3,1 г сахарозы (что соответствует 0,28 ХЕ), в 1 столовой ложке - до 9,3 г сахарозы (что соответствует 0,85 ХЕ). Препарат Стоптуссин ФИТО содержит 3,4 % (объемн.) этанола: в 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится до 0,14 г абсолютного этилового спирта в 1 столовой ложке сиропа   (15 мл) - до 0,42 г абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата Стоптуссин ФИТО для взрослых (60 мл) содержится до 1,68 г абсолютного этилового спирта.

Условия хранения

В сухом месте