Инструкция по применению
Стоптуссин Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Чехия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бутамират+Гвайфенезин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 100 мг+ 4 мг/1 мл
Срок годности: 60

Действующее вещество

Бутамират+Гвайфенезин

Состав

Гвайфенезин 100 мг 2.5 г, бутамирата дигидроцитрат 4 мг 100 мг.Вспомогательные вещества: этанол 96% - 300 мг, ароматизатор цветочный (аромат альпийских цветов) - 2 мг, вода очищенная - 7 мг, полисорбат 80 -1 мг, солодки экстракт жидкий - 3 мг, пропиленгликоль - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Бутамирата дигидроцитрат: При приеме внутрь бутамирата дигидроцитрат быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Связывание с белками плазмы составляет 94%. Подвергается метаболизму с образованием 2 метаболитов, также обладающих противокашлевым действием. Т1/2 - 6 ч. Метаболиты выводятся в основном (90%) почками и лишь небольшая часть через кишечник. Гвайфенезин: Гвайфенезин при приеме внутрь быстро всасывается из ЖКТ. Связывание с белками плазмы незначительное. Гвайфенезин быстро метаболизируется, с образованием неактивных метаболитов, которые выводятся почками. Т1/2 - 1 ч.

Показания

— сухой раздражающий кашель (в т.ч. при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей);— для облегчения кашля в пред- и послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Препарат принимают после еды. Соответствующее количество капель растворяют в 100 мл жидкости (вода, чай, фруктовый сок).Интервал между приемами должен составлять 6-8 ч. Употребление большого количества жидкости во время курса лечения усиливает его эффективность. При применении у детей с массой тела менее 7 кг возможно снижение дозы, вследствие того, что ребенок не выпивает все 100 мл приготовленной смеси, тем не менее, не следует превышать общую концентрацию препарата. При отсутствии положительного эффекта необходима консультация врача. Инструкция по использованию шприца для дозирования Для простого и точного дозирования препарата можно воспользоваться шприцом для дозирования (если прилагается). Шкала на шприце показывает количество капель в отмеренной дозе. 1. Открутить крышку флакона (против часовой стрелки). 2. Поместить шприц в адаптер на шейке флакона в вертикальном положении. 3. Флакон с помещенным в него шприцом следует перевернуть дном вверх. Плотно удерживая шприц и вытягивая поршень, набрать необходимое количество препарата. 4. Если требуется отмерить дозу 40 капель, следует набрать 10+30 капель. 5. Перевернуть флакон снова в вертикальное положение. 6. Осторожно вытащить шприц с препаратом из адаптера флакона. 7. Растворить набранную дозу препарата в воде, чае или фруктовом соке. 8. Закрутить флакон с препаратом (по часовой стрелке). 9. После использования следует промыть шприц теплой водой.

Противопоказания

— миастения;— детский возраст до 6 месяцев;— I триместр беременности;— период лактации (грудного вскармливания);— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Условия хранения

В сухом месте