
Инструкция по применению
Стрепсилс Экспресс Таблетки для рассасывания мята и анис 24 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Великобритания
Производитель: Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+Лидокаин
Количество в упаковке: 24
Срок годности: 36.0



Описание

Плоскоцилиндрические таблетки голубовато-зеленого цвета с изображением буквы «S» с двух сторон таблетки, с запахом ментола. Допускается наличие белого налета, незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев

Действующее вещество

Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+Лидокаин

Состав

1 таблетка содержит:активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт - 1,2 мгамилметакрезол - 0,6 мглидокаина гидрохлорида моногидрат - 10 мгвспомогательные вещества: винная кислота — 26 мг, натрия сахаринат — 2,08 мг, левоментол — 2,08 мг, мяты перечной листьев масло — 2,08 мг, аниса семян масло — 0,52 мг, краситель хинолиновый желтый — 0,0046 мг, индигокармин — 0,0156 мг, сахароза жидкая — 1523,4 мг, декстроза жидкая (декстроза, олиго- и полисахариды) — 980,9 мг

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в т.ч. профессионального характера — у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности), охриплость, воспаление слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым и детям старше 12 лет — каждые 2–3 ч рассасывать по 1 табл.Не применять более 8 табл. в течение 24 ч. Продолжительность применения — не более 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата,детский возраст (до 12 лет).

Побочные действия

Аллергические реакции, потеря чувствительности языка.

Передозировка

Маловероятна, возможная передозировка может привести к анестезии верхних отделов пищеварительного тракта.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не зарегистрировано.

Особые указания

При возможной потере чувствительности языка, рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды. Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 табл. содержит 2,6 г сахара.

Условия хранения

В сухом месте