Инструкция по применению
Стрептоцид Мазь для наружного применения 10% 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфаниламид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%

Описание

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Сульфаниламид

Состав

В 100 г мази содержится: Действующее вещество Сульфаниламид (стрептоцид) 10,0 г Вспомогательные вещества Вазелин 90,0 г

Форма выпуска

Мазь

Показания

В составе комплексной терапии: гнойные раны инфицированные ожоги (I-II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы мягких тканей.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят непосредственно на пораженную поверхность кожи или на марлевую салфетку, перевязку производят через 1-2 дня. Курс лечения 10-14 дней. Если в течение 10-14 дней улучшения не наступила, то следует обратится к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевание кроветворной системы, угнетение костномозгового кровотечения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечно-печеночная недостаточность азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатетрагидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции, при длительном применении больших доз - системное действие: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, кристаллургия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочное состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия, при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха. Лечение обильное питье, при случайном приеме внутрь - промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Миелотоксичные лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых к сульфаниламиду штаммов микроорганизмов. Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат и назначить соответствующее лечение. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Учитывая побочные действия лекарственного средства, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Срок хранения после открытия

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.