Инструкция по применению
Стрептоцид Мазь 10% 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфаниламид
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь белого или светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Сульфаниламид

Состав

На 100 г Действующее вещество: сульфаниламид (стрептоцид) - 10 г. Вспомогательное вещество: вазелин - 90 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I-II ст.) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят непосредственно на пораженную поверхность кожи или на марлевую салфетку, перевязку производят через 1-2 дня. Курс лечения 10-14 дней. Если в течение 10-14 дней улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечно-печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции, при длительном применении больших доз - системное действие: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметши любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия, при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха. Лечение: обильное питье, при случайном приеме внутрь - промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Миелотоксичные лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых к сульфаниламидам штаммов микроорганизмов. Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат и назначить соответствующее лечение. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Учитывая побочные действия лекарственного средства, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.