Инструкция по применению
Стрептоцид 10% Мазь 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфаниламид
Количество в упаковке: 1

Описание

Мазь белого или светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Сульфаниламид

Состав

Действующее вещество: Сульфаниламид (Стрептоцид) - 10, 00г Вспомогательное вещество: Вазелин - 90, 00 г

Форма выпуска

Мазь

Показания

В составе комплексной терапии:, гнойные раны, инфицированные ожоги (I и II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят непосредственно на пораженную поверхность или на марлевую салфетку перевязки производят через 1-2 дня. Курс лечения 10-14 дней. Если в течение 10-14 дней не наступает улучшения или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечно-печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции при длительном применении больших доз - системное действие: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха. Лечение: обильное питье, при случайном приеме внутрь - промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если вы принимаете другие лекарственные препараты, в том числе безрецептурные, перед применением препарата Стрептоцид следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат и назначить соответствующее лечение. Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых к сульфаниламидам штаммов микроорганизмов. Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводились. Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.