Инструкция по применению
Стрептоцид Порошок для наружного применения 2 г

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: МЕЛИГЕН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфаниламид
Количество в упаковке: 1

Описание

Белый или почти белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха.

Действующее вещество

Сульфаниламид

Состав

Сульфаниламид (стрептоцид) - 2,0 г или 5,0 г.

Форма выпуска

Порошок

Показания

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I - II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят непосредственно на пораженную поверхность перевязки проводят через 1-2 дня. Максимальная разовая доза для взрослых - 5 г, максимальная суточная доза - 15 г. Для детей старше 3 лет: разовая доза - 300 мг, суточная доза - 300 мг. Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам. Беременность, период грудного вскармливания. Заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, тиреотоксикоз, хроническая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, азотемия, порфирия, печеночная недостаточность, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны аллергические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата. Кроме того, возможны: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или были замечены любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха. Лечение: обильное питьё при случайном приеме внутрь - промывание желудка.

Взаимодействие с другими препаратами

Миелотоксичеекие лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости назначают противомикробные препараты внутрь. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции печени и почек. Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось. Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.