Инструкция по применению
Стрикс Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Дания
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Черники плодов экстракт сухой+бетакаротен
Количество в упаковке: 30



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, темно-фиолетового цвета с фиолетовыми вкраплениями различной интенсивности окраски.

Действующее вещество

Черники плодов экстракт сухой+бетакаротен

Состав

1 таблетка содержит: Действующие вещества*: черники плодов экстракт сухой 15% (эквивалентно 12,36 мг антоцианозидов в пересчете на антоцианидины) 82,40 мг бетакаротена 20% концентрат (в пересчете на 1,2 мг бетакаротена) 6,00 мг Вспомогательные вещества: черники плодов сока гранулят - 178,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 118,43 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный - 29,09 мг, кремния диоксид - 6,76 мг, магния стеарат - 3,80 мг. Состав оболочки: метилцеллюлоза - 4,00 мг. *- количества действующих веществ с учетом избытка 30%: черники плодов экстракт сухой 15% (эквивалентно 12,36 мг антоцианозидов в пересчете на антоцианидины) - 107,12 мг, бетакаротена 20% концентрат (в пересчете на 1,2 мг бетакаротена) - 7,80 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии по следующим показаниям: - проявления синдрома зрительного утомления при длительной работе с компьютером и чтении, - близорукость различной степени, - нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия), - диабетическая ретинопатия, - центральная и периферическая дистрофия сетчатки, - первичная глаукома, - в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. Детям с 7 лет: по 1 таблетке в день. Взрослым: по 2 таблетки в день. Таблетку запивать необходимым количеством воды. Курс лечения 1 месяц. Повторные курсы по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 7 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

При индивидуальной непереносимости к компонентам препарата возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

При применении препарата в рекомендованных дозах симптомы передозировки не наблюдались. В случае передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25С и в недоступном для детей месте.