Инструкция по применению
Структум Капсулы 500 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Pierre Fabre
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

Активное вещество: хондроитин сульфат натрия 500 мг. Вспомогательные вещества: тальк - 10 мг. Состав оболочки капсулы: индигокармин, титана диоксид, желатин. Размер № 0.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Более 70% хондроитина сульфата всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата составляет 13%. При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы Cmax в плазме отмечается через 3&ndash,4 ч, в синовиальной жидкости через 4&ndash,5 ч. Абсорбированный в ЖКТ препарат накапливается в синовиальной жидкости. Выводится почками.

Показания

Остеоартроз, межпозвонковый остеохондроз.

Способ применения и дозы

Капсулы принимают внутрь, запивая водой. Взрослым и подросткам в возрасте 15 лет и старше препарат назначают в дозе 1 г/сут - по 2 капсулы 250 мг или по 1 капсуле 500 мг 2 раза/сут. Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 мес. Терапевтическое действие препарата сохраняется в течение 3-5 месяцев после его отмены в зависимости от локализации и стадии заболевания. При необходимости возможно проведение повторных курсов лечения, продолжительность которых врач устанавливает индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 15 лет (ввиду отсутствия точных данных), применение при беременности и кормлении грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Структум не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) ввиду отсутствия достаточного количества клинических данных.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота. Аллергические реакции: редко - крапивница, эритема, кожный зуд.

Передозировка

Симптомы: редко - тошнота, рвота, диарея, при длительном приеме в чрезмерно высоких дозах (более 3 г/сут) возможны геморрагические высыпания. Лечение: проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с препаратом Структум возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.

Особые указания

С осторожностью назначают препарат при кровотечениях или склонности к кровотечениям.

Условия хранения

Беречь от детей