Инструкция по применению
Струмель Т Таблетки для рассасывания гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60.0



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Euspongia officinalis (Эуспонгия оффициналис) D3 150 мг, Calcium iodatum (Кальциум иодатум) D4 90 мг, Fucus vesiculosus D4 (Фукус везикулозус) 30 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом (при заболеваниях щитовидной железы применение данного лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации с лечащим врачом).

Способ применения и дозы

Если лечащий врач не рекомендует иначе, следует использовать препарат 3 раза в день по 1 таблетке, медленно рассасывая во рту до полного растворения. Средний курс лечения составляет 12 недель.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы, прием лекарственных препаратов, угнетающих функцию щитовидной железы, детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие симптомы тиреотоксикоза при длительных курсах лечения. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы, усиление симптомов тиреотоксикоза.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно совместное применение с L- тироксином, по рекомендации и под контролем врача возможно снижение дозы L-тироксина. При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться с лечащим врачом.

Особые указания

Струмель® Т не заменяет препараты, назначаемые врачом при данном заболевании. При врачебном обследовании щитовидной железы врача необходимо поставить в известность о приеме данного препарата, в противном случае оценка результатов обследований может быть некорректна. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Условия хранения

В сухом месте