Инструкция по применению
Субетта Таблетки для рассасывания 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Антитела к эндотелиальной NO-синтазе
Количество в упаковке: 100



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись SUBETTA.

Действующее вещество

Антитела к эндотелиальной NO-синтазе

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Препарат Субетта® показан к применению у взрослых. Сахарный диабет 1 типа в качестве дополнения к базис-болюсной инсулинотерапии. Сахарный диабет 2 типа в составе комплексной терапии. Нарушенная толерантность к глюкозе, в т.ч. у пациентов с повышенной массой тела и ожирением.

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части. Таблетку следует держать во рту, не проглатывая, до полного растворения. Сахарный диабет 1 и 2 типа На один прием – 1 таблетка (держать во рту до полного растворения не во время приема пищи). Длительность и частота приема устанавливается врачом и может варьироваться от 2-х до 4-х раз в сутки – в зависимости от степени компенсации сахарного диабета. Нарушенная толерантность к глюкозе На один прием 2 таблетки 2 раза в сутки (держать во рту до полного растворения за 15 минут до приема пищи). Длительность лечения устанавливается врачом и, как правило, составляет не менее 12 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Применение препарата Субетта® противопоказано во время беременности. Период грудного вскармливания Применение препарата Субетта® противопоказано во время грудного вскармливания.

Особые указания

Перед применением препарата Субетта® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.