Инструкция по применению
Сульфадимезин таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сульфадимидин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Сульфадимидин

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: сульфадимидин 500 мг.; Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, стеариновая кислота, полисорбат 80.;

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция - быстрая (преимущественно в тонкой кишке). Связь с белками плазмы - 75-86%. Хорошо проникает в ткани (в т.ч. легкие, ликвор). Метаболизируется в печени путем ацетилирования. Т1/2 -7 ч. Выводится почками путем клубочковой фильтрации. Ацетилированные метаболиты при концентрировании в моче могут выпадать в осадок. Растворимость метаболитов улучшается при защелачивании мочи.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: - Тонзиллит; - Гайморит; - Средний отит; - Обострение хронического бронхита; - Пневмония; - Воспалительные заболевания желчевыводящих и мочевыводящих путей; - Шигеллез; - Рожа; - Раневая инфекция.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь.; Пневмония;Для взрослых - на 1 прием назначают 2 г, затем по 1 г 4-6 раз в сутки.; Для детей старше 3-х лет - 0.1 г/кг на первый прием, затем по 0,1-0,15 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Прием препарата прекращают через 2-3 дня после исчезновения симптомов заболевания.; Тонзиллит;Для взрослых - по 1 г 2-3 раз в сутки; Для детей старше 3-х лет - по 0.05-0.075 г/кг/сут, разделенные на 2-3 приемов.; Длительность терапии: 5-7 дней.; Гайморит;Для взрослых - по 1 г 4-6 раз в сутки; Для детей старше 3-х лет - по 0,1-0,15 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Длительность терапии: 7-10 дней.; Средний отит;Для взрослых - по 1 г 2 раз в сутки; Для детей старше 3-х лет - по 0,05-0,075 г/кг/сут, разделенные на 2 приемов.; Длительность терапии: 7-10 дней.; Обострение хронического бронхита;Для взрослых - по 1 г 4-6 раз в сутки; Для детей старше 3-х лет - по 0,1-0,15 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Длительность терапии: 10-14 дней.; Воспалительные заболевания желчевыводяших и мочевыводяших путей;Для взрослых - по 0.5 г 4-6 раз в сутки; Для детей старше 3-х лет - по 0.05-0.075 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Длительность терапии: 7-10 дней.; Шигеллез: Проводят 2 курса лечения.; Первый курс: 1 и 2 день - по 1 г каждые 4 ч (всего 6 г/сут), 3 и 4 день - по 1 г каждые 6 ч (4 г/сут), 5 и 6 день - 1 г каждые 8 ч (3 г/сут).; Через 5-6 дней проводят второй курс: 1 и 2 день - по 1 г каждые 4 ч, ночью - через 8 ч (всего 5 г/сут), 3 и 4 день - 1 г через 4 ч (4 г/сут, ночью не дают), 5 день - 3 г/сут.; Рожа;Для взрослых -по 1 г 4-6 раз в сутки.; Для детей старше 3-х лет - по 0.1-0.15 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Длительность терапии: 7-10 дней.; Раневые инфекиии: Для взрослых - на 1 прием 2 г, затем по 1 г 4-6 раз в день.; Для детей старше 3-х лет - по 0.05-0.075 г/кг/сут, разделенные на 4-6 приемов.; Длительность терапии при легкой форме - 5-7 дней, при тяжелой форме - около 10 дней.; Высшие дозы;Для взрослых: разовая - 2 г, суточная - 7 г; Для детей старше 3-х лет: суточная - 0.1-0.15 г/кг.

Противопоказания

- Гиперчувствительность (в том числе к другим сульфаниламидам); - Угнетение костномозгового кроветворения; - Хроническая почечная недостаточность; - Азотемия; - Врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; - Порфирия; - Детский возраст до 3-х лет; - Гипербилирубинемия у детей (риск развития билирубиновой энцефалопатии).; С осторожностью;Пациентам с нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями в анамнезе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Тошнота, рвота, кристаллурия, аллергические реакции, лейкопения, агранулоцитоз.

Передозировка

Данные по передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает эффективность бактерицидных, антибиотиков, действующих только на делящиеся микроорганизмы (в т.ч. пенициллинов и цефалоспоринов).; Повышает (взаимно) гематотоксичность хлорамфеникола, тиамазола.; Бензокаин, прокаин снижают противомикробную активность (при гидролизе высвобождают пара-аминобензойную кислоту).; Аскорбиновая кислота, метенамин повышают риск развития кристаллурии.; Нестероидные противовоспалительные препараты, гипогликемические лекарственные средства (производные сульфонилмочевины), фенитоин и антикоагулянты кумаринового ряда усиливают выраженность побочных эффектов препарата (лейкопения, агранулоцитоз).; Антациды снижают всасывание в кишечнике.; При токсоплазмозе возможно сочетание с пириметамином.; Миелотоксичные лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Особые указания

Во время лечения следует обеспечить адекватное потребление жидкости в связи с риском развития кристаллурии.; При длительном применении необходим контроль показателей периферической крови.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Не влияет на вождение автотранспорта и занятие потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте