# Инструкция по применению
# Сульфаргин Мазь для наружного применения 1 % 50 г

## Характеристики




Форма выпуска: Мазь
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сульфадиазин серебра
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24

## Действующее вещество

Сульфадиазин серебра

## Состав

1 г сульфадиазин серебра 10 мг. Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, пропиленгликоль, цетилстеариловый спирт, глицерола моностеарат 40-55, полисорбат 80, метил пара-гидроксибензоат, пропил пара-гидроксибензоат, вода очищенная.

## Форма выпуска

Мазь

## Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Сульфаргин не предоставлены.

## Показания

Лечение инфицированных поверхностных ран и ожоговых поверхностей со слабой экссудацией, пролежней, ссадин, кожных язв, пересаженных участков кожи; а также профилактика их инфицирования.

**Способ применения и дозы**

Применяют наружно. После хирургической обработки раны и удаления некротических тканей мазь наносят на поврежденную поверхность тонким слоем (2-4 мм) под повязку или открытым способом. Повязку меняют 1-2 раза/сут или реже. Максимальная разовая доза - 300 г. Длительность лечения - до 3 недель.

**Противопоказания**

— беременность — период лактации — выраженный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы — детский возраст до 1 года — повышенная чувствительность к сульфаниламидам. Сульфаргин не следует применять для лечения глубоких гнойных ран и ожоговых поверхностей с обильной экссудацией.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

**Побочные действия**

Системные реакции: при длительном применении Сульфаргина на обширных ожоговых поверхностях возможны - нарушения пищеварения и изменение картины периферической крови (лейкопения), диспептические симптомы и кожные проявления аллергических реакций, характерные для сульфаниламидных препаратов. Местные реакции: редко - кратковременное местно-раздражающее действие (жжение, боль) которые обычно проходят самостоятельно через 5-10 мин после наложения повязки с мазью.

**Передозировка**

Данные о передозировке препарата Сульфаргин не предоставлены.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Сульфаргин не предоставлены.

**Особые указания**

При применении мази на обширной поверхности следует контролировать функциональное состояние почек, печени и содержание форменных элементов крови; назначать больным обильное щелочное питье.

**Условия хранения**

В сухом месте