Инструкция по применению
Сульгин Авексима Таблетки 500 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сульфагуанидин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Описание

Противомикробное средство, сульфаниламид

Действующее вещество

Сульфагуанидин

Состав

сульфагуанидина моногидрат 500 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 90 мг, кальция стеарат - 4 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 6 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь препарат незначительно абсорбируется из пищеварительного тракта, в результате чего возникает высокая бактериостатическая концентрация в кишечнике.

Показания

бактериальная дизентерия, колит и энтероколит, подготовка к операции на толстой кишке.

Способ применения и дозы

При острой дизентерии проводят 2 курса лечения. Первый курс: в 1 и 2 день - 1 г каждые 4 ч (всего 6 г/сут), 3 и 4 день - 1 г каждые 6 ч (4 г/сут), 5 и 6 день - 1 г каждые 8 ч (3 г/сут). При необходимости через 5-6 дней проводят второй курс: 1 и 2 день - по 1 г каждые 4 ч, ночью - через 8 ч (всего 5 г/сут), 3 и 4 день - 1 г через 4 ч (4 г/сут), ночью не дают, 5 день - 3 г/сут. Детям старше 3 лет - 0.5 г 4 раза/сут в течение 7 дней. При лечении других инфекций : взрослым - внутрь, по 1-2 г каждые 4-6 ч, в следующие 2-3 дня - половинные дозы. Детям старше 3 лет - в первый день по 0.1 г/кг /сут равными дозами каждые 4 ч, в следующие дни - по 0.25-0.5 г каждые 6-8 ч. Для профилактики послеоперационных осложнений со стороны кишечника - по 0.05 г/кг каждые 8 ч, в течение 5 дней до и 7 дней после операции. Высшие дозы для взрослых: разовая - 2 г, суточная - 7 г.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата или другим сульфаниламидамдефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы нефроуролитиаз порфирия B12-дефицитная анемия беременность период лактации детский возраст до 3 лет гипербилирубинемия (у детей).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Со стороны мочевыделительной системы: кристаллурия. Аллергические реакции: крапивница, эксфолиативный дерматит. Прочие: гиповитаминоз B, лейкопения, неврит.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает надежность пероральной контрацепции. Бензокаин, прокаин снижают противомикробную активность (при гидролизе высвобождают ПАБК). Нестероидные противовоспалительные препараты, гипогликемические лекарственные средства (производные сульфонилмочевины), фенитоин и антикоагулянты непрямого действия усиливают выраженность побочных эффектов препарата. Аскорбиновая кислота, гексаметилентетрамин повышают риск развития кристаллурии. Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Особые указания

С целью предупреждения кристаллурии в период лечения больные должны получать обильное питье (2-3 л/сут). Раннее прекращение лечения или недостаточные дозы могут приводить к появлению устойчивых штаммов возбудителей. В период лечения рекомендуется прием витаминов группы В.