Инструкция по применению
Супироцин-Б Мазь туба 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бетаметазон+Мупироцин
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь Супироцин-Б - антибиотик широкого спектра действия. Активное вещество - мупироцин.

Действующее вещество

Бетаметазон+Мупироцин

Состав

Мупироцин 20 мг, бетаметазон (в форме дипропионата) 500 мкг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Для наружного применения: бактериальные инфекции кожи (в т.ч. импетиго, фолликулит, фурункулез), вторичные бактериальные инфекции (в т.ч. инфицированные экземы, язвы, небольшие раны и ожоги), профилактика инфекции при небольших ранах и хирургических разрезах.Для интраназального применения: воспалительные заболевания полости носа (в т.ч. вызванные штаммами Staphylococcus aureus, полирезистентными и устойчивыми к метициллину).

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка: наносить мазь тонким слоем на пораженное место 2-3 раза в день в течение 5-14 дней. Применять только для обработки пораженных мест, имеющих длину не более 10 см или площадь - не более 100 см2. Если в течение 3-5 дней у пациентов не наблюдается клинической реакции, их нужно обследовать повторно.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности.

Побочные действия

Местные реакции: при наружном применении возможны ощущение жжения, покалывания, зуд, при интраназальном применении возможен ринит.

Передозировка

Обратимое угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, проявления синдрома Кушинга, гипергликемия, глюкозурия.

Особые указания

Противопоказания - повышенная чувствительность к мупироцину.