Инструкция по применению
Супрадин Таблетки шипучие 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Франция
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36.0





Описание

Средство, влияющее на метаболические процессы, поливитаминно-минеральный комплекс*1) Белинская А.Ю., Торшин И.Ю. с соавт. Сравнительное фармакоэкономическое исследование витаминно-минеральных комплексов для реабилитации в период повышенных потребностей в микронутриентах. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2015. 3: 3-13.2) Маркетинговое исследование "SUPRADYN active Pharmacy Test", Австрия 2012 год, Sensor Marktforschung

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка содержит Активные вещества: Витамин А (ретинол) в форме витамина А пальмитата 3333 МЕ Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида 24,7 мг 20,0 мг Витамин В2 (рибофлавин) в форме рибофлавина натрия фосфата дигидрата 6,82 мг 5,0 мг Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 10,0 мг Витамин В12 (цианокобаламин) 5,0 мкг Витамин С (аскорбиновая кислота) 150,0 мг Витамин D3 (колекальциферол) 500 МЕ Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) 10,0 мг Биотин 0,25 мг Кальция пантотенат 11,6 мг Фолиевая кислота 1,0 мг Никотинамид 50,0 мг а также минералы и микроэлементы Кальций в форме кальция глицерофосфата и в форме кальция пантотената 51,3 мг Магний в форме магния глицерофосфата 5,0 мг Железо в форме железа карбоната, сахарата 1,25 мг Марганец в форме марганца сульфата (моногидрата) 0,5 мг Фосфор в форме кальция глицерофосфата, в форме магния глицерофосфата, в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида 47,0 мг Медь в форме меди сульфата (безводного) 0,1 мг Цинк в форме цинка сульфата (моногидрата) 0,5 мг Молибден в форме натрия молибдата (дигидрата) 0,1 мг Вспомогательные вещества: сахароза 1086,384 мг, маннитол 17,25 мг, тартаровая кислота 1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, сахарин натрия 18,0 мг, лимонный ароматизатор permaseal 60.827-71 60,0 мг, лимонный ароматизатор permastable 3206 100,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в том числе: - при неполноценном и несбалансированном питании (диеты), - при повышенных физических и умственных нагрузках, - в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных, - в комплексной терапии хронического алкоголизма, - в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии.

Способ применения и дозы

Внутрь, предварительно растворив в стакане воды. Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 таблетка шипучая в день, или по указанию врача. Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих вышеуказанные, а также детям до 12 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность, в том числе при аллергии на один или несколько компонентов препарата, а также при наличии гипервитаминоза A и D, гиперкальциемии, почечной недостаточности и в период лечения ретиноидами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск для плода в случае приема препарата в рекомендованных дозах во время беременности.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

Беречь от детей