Инструкция по применению
Супрадин Таблетки шипучие 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Франция
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 36.0



CH-20221115-39

Описание

Средство, влияющее на метаболические процессы, поливитаминно-минеральный комплекс

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка содержит Активные вещества: Витамин А (ретинол) в форме витамина А пальмитата 3333 МЕ Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида 24,7 мг 20,0 мг Витамин В2 (рибофлавин) в форме рибофлавина натрия фосфата дигидрата 6,82 мг 5,0 мг Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 10,0 мг Витамин В12 (цианокобаламин) 5,0 мкг Витамин С (аскорбиновая кислота) 150,0 мг Витамин D3 (колекальциферол) 500 МЕ Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) 10,0 мг Биотин 0,25 мг Кальция пантотенат 11,6 мг Фолиевая кислота 1,0 мг Никотинамид 50,0 мг а также минералы и микроэлементы Кальций в форме кальция глицерофосфата и в форме кальция пантотената 51,3 мг Магний в форме магния глицерофосфата 5,0 мг Железо в форме железа карбоната, сахарата 1,25 мг Марганец в форме марганца сульфата (моногидрата) 0,5 мг Фосфор в форме кальция глицерофосфата, в форме магния глицерофосфата, в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида 47,0 мг Медь в форме меди сульфата (безводного) 0,1 мг Цинк в форме цинка сульфата (моногидрата) 0,5 мг Молибден в форме натрия молибдата (дигидрата) 0,1 мг Вспомогательные вещества: сахароза 1086,384 мг, маннитол 17,25 мг, тартаровая кислота 1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, сахарин натрия 18,0 мг, лимонный ароматизатор permaseal 60.827-71 60,0 мг, лимонный ароматизатор permastable 3206 100,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в том числе: - при неполноценном и несбалансированном питании (диеты), - при повышенных физических и умственных нагрузках, - в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных, - в комплексной терапии хронического алкоголизма, - в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии.

Способ применения и дозы

Внутрь, предварительно растворив в стакане воды. Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 таблетка шипучая в день, или по указанию врача. Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих вышеуказанные, а также детям до 12 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность, в том числе при аллергии на один или несколько компонентов препарата, а также при наличии гипервитаминоза A и D, гиперкальциемии, почечной недостаточности и в период лечения ретиноидами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск для плода в случае приема препарата в рекомендованных дозах во время беременности.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно, и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Таблетка содержит около 300 мг натрия (эквивалентно 700 мг поваренной соли). Пациентам, соблюдающим диету с минимальным потреблением соли, рекомендуется принимать драже. Таблетка содержит около 1000 мг кристаллического сахара (сахарозы). При приеме рекомендуемой суточной дозы это количество пренебрежимо мало даже при необходимости соблюдения противодиабетической диеты (1 г кристаллического сахара соответствует 0,1 хлебной единицы).

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При комнатной температуре