Инструкция по применению
Цитамины Супренамин Таблетки покрытые пленочной оболочкой 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые пленочной оболочкой
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40



Описание

Супренамин показан при различных нарушениях функции надпочечников, таких как: Пожилой возраст (для поддержания нормальной надпочечниковой функции и гормонального баланса) Наследственные заболевания, связанные с нарушением функции надпочечников Пред и послеоперационный период при операциях на надпочечниках Синдром «уставших» надпочечников Состояния после экстремальных стрессорных нагрузокНадпочечники — это небольшие железы полулунной формы, расположенные поверх каждой почки. Каждый надпочечник состоит из двух слоев — коркового и мозгового. Первый слой выделяет такие гормоны как кортизол, альдостерон и небольшое количество половых гормонов — эстрогена и тестостерона. В мозговом слое происходит выработка адреналина и норадреналина.Под воздействием стресса происходит стимуляция надпочечников и выброс в кровь адреналина и кортизола. Адреналин повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и увеличивает расход энергии. Такая реакция считается немедленным ответом на стресс. Кортизол, как основной гормон стресса, увеличивает уровень сахара в крови, улучшает использование мозгом глюкозы и повышает доступность веществ, которые восстанавливают ткани. Как только действие стресса проходит, уровень гормонов возвращается к прежним значениям. Однако если стрессовый фактор присутствует постоянно, организм оказывается в условиях постоянного напряжения. В таких условиях надпочечники истощаются и происходит их дезадаптация на клеточном уровне. В медицине это состояние называется «синдром стресса надпочечников» или «синдром усталости надпочечников».Для восстановления поврежденной структуры клеток в первую очередь нужны протеины.

Белки (протеины) контролируют процессы межклеточного взаимодействия и определяют способность к самовосстановлению клетки. Все виды тканей организма человека, содержат определенные типы протеинов. Это удалось установить, благодаря открытию Гюнтера Блобела, который получил за свою научную работу Нобелевскую премию. Ученый выяснил, что белковая молекула является саморегулирующейся. Недостаток пептидов (с возрастом или при патологии) ускоряет износ тканей, процессы старения и приводит к развитию заболеваний.Как действует? Супренамин — это комплекс белков и нуклеопротеидов, получаемых из ферментно-эндокринного сырья, которое по белковому составу клеток идентично у всех млекопитающих. Как и все Цитамины, за счет механизма трансцитоза. Супренамин действует целенаправленно на клетки надпочечников и способствует нормализации их функции.Благодаря механизму транцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели, в данном случае целью являются клетки надпочечников. Попадая в надпочечники, Супренамин насыщает их оптимальным белковым «рационом», позволяя клеткам быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций – выработку гормонов. По результатам клинических исследований можно сказать, что курсовое применение Супренамина у лиц, продолжительное время подвергавшихся сильным стрессорным воздействиям, способствовало восстановлению нарушенного гормонального обмена, что подтверждалось данными лабораторных исследований. Установлено, что применение Супренамина приводило к улучшению общего состояния пациентов, при этом они отмечали повышение физической и умственной работоспособности, улучшение настроения, сна.

Состав

Состав: железы надпочечные крупного рогатого скота

Форма выпуска

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника полипептидов и нуклеиновых кислот.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-3 таблетки 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды, не разжевывая. Продолжительность приема - 10-14 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступным для детей месте, при температуре от +2°С до +25°С.