Инструкция по применению
Суприма-Бронхо Сироп 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1



Описание

Полупрозрачная жидкость коричневого цвета с характерным ароматом. Допускаются мелкодисперсные частицы, осадок экстрактов лекарственного растительного сырья.

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

5 мл сиропа содержат: _действующие вещества:_ адатоды сосудистой экстракт густой - 30,0 мг, солодки голой экстракт густой - 20,0 мг, куркумы длинной экстракт густой - 10,0 мг, базилика священного экстракт густой - 10,0 мг, имбиря лекарственного экстракт густой - 10,0 мг, паслена желтоплодного экстракт густой - 5,0 мг, перца длинного экстракт густой - 5,0 мг, кардамона настоящего экстракт густой - 5,0 мг, _вспомогательные вещества:_ сахароза, сорбитол 70 % раствор, камедь гуаровая, левоментол, пропиленгликоль, натрия бензоат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат натрия, бронопол, карамель, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор фенхеля, ароматизатор малиновый, хлористоводородная кислота, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Применяется в качестве средства симптоматической терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем: фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, начальные стадии коклюша, при хронических заболеваниях органов дыхания: «бронхит курильщиков», «лекторский» ларингит.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. Перед употреблением взбалтывать. Детям 3-5 лет: по 2,5 мл 3 раза в день. Детям 6-14 лет: по 2,5-5 мл 3 раза в день. Взрослым и детям старше 14 лет: по 5-10 мл 3 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к компонентам входящим в состав препарата Суприма-Бронхо, * дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, * детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Суприма-Бронхо в период беременности и грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы частота неизвестна: аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Суприма-Бронхо не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. По показаниям, возможно одновременное применение препарата Суприма-Бронхо с противомикробными лекарственными средствами. Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (флакон в пачке). Хранить в недоступном для детей месте.