Инструкция по применению
SW Гепато Комплекс СВ Капсулы 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ростовская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Топинамбур
Количество в упаковке: 20



Описание

Препарат рекомендуется при: - хроническом вирусном гепатите - жировом гепатозе - кистах в печени - злоупотреблении алкоголем, циррозе - дискинезии желчевыводящих путей, застойных явлениях в желчном пузыре - профилактика образования желчных камней - гастродуодените - холецистите - дисбактериозе - желудочно-кишечной диспепсии - синдроме раздраженной толстой кишки - кожных проявлениях аллергии, псориазе - слабости - утомляемости - токсикозе - переедании, тяжести в правом подреберье

Действующее вещество

Топинамбур

Состав

Топинамбур, экстракт расторопши, экстракт элеутерококка, экстракт календулы, экстракт артишока, экстракт лабазника, экстракт цветков бессмертника, ликопин10%, витамин Е, В6, В12, цинка аспарагинат, хрома пиколинат, марганца аспарагинат, селекор С, Е460, Е470.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Хронический холецистит. Хронический панкреатит. Гепатит, цирроз. Дисбактериоз. СРК (синдром раздраженного кишечника). Лишний вес. При переедании, злоупотреблении алкоголем, интоксикации, отравлениях, хроническом вирусном гепатите, дискинезии желчевыводящих путей, гастродуодените, холецистите, бронхите, дисбактериозе, желудочно-кишечной диспепсии, синдроме раздраженной толстой кишки, кожных проявлениях аллергии. Назначается при следующих заболеваниях: холецистит, интоксикация, дисбактериоз, выведение токсинов, дискинезия желчевыводящих путей, гастродуоденит, профилактика гепатотоксического действия, нарушение функции печени, диспепсические явления, синдром раздраженного кишечника, аллергические заболевания кожи, поддержание работы печени

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке или по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц, при необходимости прием можно повторить. Дозировка: витамин Е – 10мг, витамин В6 – 2мг, витамин В12 – 1мг, цинк – 6мг, хром – 60мкг, марганец – 0.8мг, селен – 30мкг.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение сердечной деятельности, атеросклероз.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Передозировка

Не описана.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей, месте при температуре не выше 25°С.