Инструкция по применению
SW уропронорм Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Оптисалт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Препарат Уропронорм предназначен мужчинам для устранения дисфункций мочеполовой системы, в частности для нормализации функциональности предстательной железы, эффективен в предупреждении цистита, пиелонефрита, аденомы, уретрита, а так же его применяют при импотенции.Состав Уропронорма1. Растительные экстракты: тыквенных семян, корня элеутерококка, крапивного корня, пальмы сабаль, чеснока, бадана (листья), плодов можжевельника, корня красного.2. Селен и цинк (минеральные элементы).3. Витамины пиридоксин (B6) и цианокобаламин (B12).4. Фолиевая кислота.5. Индол-3-Карбинол.6. Ликопин.Свойства Уропрнорма8 растительных экстрактов, с противопаразитарным (антисептическим), противовоспалительным, противоотёчным, противоопухолевым свойствами,Цинк и селен – микроэлементы, повышающие естественную выработку мужских гормонов – тестостерона и спермообразования,Витамины B6 и B12 – укрепляют нервную систему, иммунитет,Фолиевая кислота и биологически активные вещества, повышают активность иммунитета, противоопухолевую защиту, деятельность половых желез.

Состав

Экстракт пальмы сабаль, экстракт семян тыквы, порошок чеснока, экстракт красного корня, экстракт бадана, экстракт элеутерококка, экстракт можжевельника, экстракт корня крапивы, индол-3-карбинол, ликопин 10%, витамин B6, B9, B12, цинка аспарагинат, селекор C, E460, E470.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника полифенольных соединений, индол-3-карбинола, ликопина, дополнительного источника витамина B6, B12, фолиевой кислоты, цинка, селена.Уропронорм применяют: при инфекциях любой этиологии мочеполовой системы. при импотенции. при простатите. при уретрите. при цистите. при бесплодии. при пиелонефрите. для предупреждения онкопатологий в половой сфере. при аденоме простаты. во время болевых ощущений при мочеиспускании. при систематических переохлаждениях. после перенесенных венерических заболеваниях. в периоды половых воздержаний. при стрессах и депрессии. при малоподвижной работе и частых застойных явлениях в малом тазу. при водянке.

Способ применения и дозы

Взрослым мужчинам по 1 таблетке или по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приёма - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, повышенное артериальное давление, нарушения сердечной деятельности, бессонница, повышенная нервная возбудимость, выраженный атеросклероз.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.