Инструкция по применению
Та-65 капсулы 250 ед N90

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Medical Horizons
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Циклоастрогенол
Количество в упаковке: 90

Описание

ТА-65 является первым в мире активатором теломеразы с клинически подтвержденной эффективностью и безопасностью. Было показано, что применение ТА-65 способствует процессам клеточного омоложения.

Действующее вещество

Циклоастрогенол

Состав

Главным компонентом препарата является циклоастрогенол – вещество природного происхождения, содержащееся в корне перепончатого астрагала. Его способность активировать теламеразу была доказана ещё в 2009 году. Вещество было опробовано на мышах. В ходе экспериментов обнаружилось, что препарат возвращает молодость особям, избавляет от многих хронических заболеваний. Негативных побочных эффектов не было обнаружено.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Что означает временная активация теломеразы при помощи TA-65®? TA-65® преимущественно воздействует на наиболее короткие теломеры. TA-65® поддерживает состояние иммунных клеток и систем организма для обеспечения нормального клеточного деления. TA-65® не делает клетки бессмертными. По сути, TA-65® применяет механизм активации теломеразы, используемый половыми и стволовыми клетками. Эти важные для организма клетки поддерживают активность теломеразы естественным образом, причем сбалансированно и с пользой для здоровья. Результатом омоложения клеток при приеме TA-65®MD являются: Снижение риска возрастных и онкологических заболеваний Омоложение иммунной системы Поддержание когнитивных функций (памяти, внимания и умственных способностей) Повышение эластичности кожи Улучшение состояния волос и ногтей Повышение качества зрения Сохранение и поддержание сексуальной энергии Увеличение плотности костной ткани   Таким образом, TA-65® представляет собой уникальное средство предупреждения и коррекции возрастных изменений, действующее через механизм активации теломеразы

Способ применения и дозы

TA65 следует принимать утром натощак (за 1 час до еды) или вечером перед сном (не ранее чем через 2 часа после приема пищи). При необходимости суточную дозу можно разделить на два приема - утром и вечером.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов TA-65.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.