Инструкция по применению
Таблетки от кашля 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 6.7 мг+250 мг

Описание

Таблетки от кашля - препарат на основе сырья растительного происхождения с противокашлевым и отхаркивающим дейтсвием.

Действующее вещество

Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]

Состав

Порошок травы термопсиса ланцетного 6.7 мг, гидрокарбонат натрия 250 мг. Вспомогательные вещества: картофельный крахмал 27.9 мг, тальк 5.4 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней. Высшая разовая доза в пересчете на термопсис – 0.1 г (14 таблеток). Высшая суточная доза в пересчете на термопсис – 0.3 г (42 таблетки). Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье. Таблетки от кашля не влияют на вождение автотранспорта и управление механизмами.