Инструкция по применению
Термопсол Таблетки от кашля таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 6,7 мг+ 250 мг

Описание

Таблетки от зеленовато-серого до зеленовато-серого с желтоватьпи оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы. Допускается наличие темных вкраплений.

Действующее вещество

Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]

Состав

Состав на 1 таблетку: Активные компоненты: Термопсиса ланцетного трава, порошок - 0,0067 мг Натрия гидрокарбонат - 0,25 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,0279 тальк - 0,0054

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Кашель с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом. Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая - 0,1 г, суточная -0,3 г.

Противопоказания

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Контролируемых исследований на беременных не проводилось. Нет данных о проникновении алкалоидов, содержащихся в траве термопсиса, через плацентарный барьер и в грудное молоко. Не применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут снижать всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса. Термопсол не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Данные о влиянии препарата на способность управления транспортньпи средством и выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.