**Инструкция по применению**
**Таблетки от кашля-Реневал 10 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10




### Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от зеленовато-серого до коричневато-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

### Состав

Состав на одну таблетку: Действующие вещества: Термопсиса ланцетного травы порошок - 6,7 мг. Натрия гидрокарбонат - 250,0 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк.

### Форма выпуска

Таблетки

### Фармакокинетика

Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

### Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) - в составе комплексной терапии.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней. Максимальная разовая доза для взрослых (в пересчете на термопсис) - 0,1 г (14 таблеток), максимальная суточная доза (в пересчете на термопсис) - 0,3 г (42 таблетки). Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; детский возраст до 12 лет; беременность и период грудного вскармливания. Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканью (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения). С осторожностью: Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов и низким содержанием натрия.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Прием препарата противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, тошнота. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Особые указания**

Для улучшения разжижения и отделения мокроты во время лечения рекомендуется обильное теплое питье. Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 ХЕ). Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.