Инструкция по применению
Таблетки от кашля-Реневал 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 6.7 мг+250 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от зеленовато-серого до коричневато-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

Действующее вещество

Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]

Состав

Таблетки - 1 таб.: Действующее вещество:Термопсиса ланцетного травы порошок - 6,7 мг, Натрия гидрокарбонат - 250,0 мг, Вспомогательные вещества: Крахмал картофельный - 27,9 мг, Тальк - 5,4 мг. Масса таблетки - 290,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней. Максимальная разовая доза для взрослых (в пересчете на термопсис) – 0,1 г (14 таблеток), максимальная суточная доза (в пересчете на термопсис) – 0,3 г (42 таблетки). Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст до 12 лет, беременность и период грудного вскармливания. Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканью (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные препараты могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Таблетки от кашля проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты во время лечения рекомендуется обильное теплое питье. Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 ХЕ).   Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Условия хранения При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.   Срок годности 4 года. Не использовать по истечении срока годности.