
Инструкция по применению
Тагиста Таблетки 16 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МАКИЗ-ФАРМА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 16 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Бетагистин

Состав

1 таблетка содержит действующее вещество: бетагистина дигидрохлорид 8,0 мг, 16,0 мг, 24,0 мг, вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 54,75/109, 5/164,25 мг, повидон (коллидон 25) – 9,0/18,0/27,0 мг крахмал картофельный – 20,0 /40,0/60,0 мг, кислота лимонная – 2,0/4,0/6,0 мг, кремния диоксид коллоидным (аэросил), – 3,0/6,0/9,0 мг, тальк– 2,8/5,6/8,4 мг, магния стеарат – 0,45/0,9/1,35 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбируется быстро, связь с белками плазмы - низкая. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови - 3 ч. Практически полностью выводится почками в виде метаболита (2-пиридилуксусной кислоты) в течение 24 ч. Период полувыведения - 3 - 4 ч.

Показания

- лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного происхождения: - синдромы, включающие головокружение и головную боль, шум в ушах, прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту: - Болезнь или синдром Меньера.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Таблетки 8 мг: по 1-2 таблетки 3 раза в день. Таблетки 16 мг: по 1/2- 1 таблетке 3 раза в день. Таблетки 24 мг: по 1 таблетке 2 раза в день. Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после двух недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения. Лечение длительное. Длительность курса лечения определяется индивидуально.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата: - возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных), - беременность и период лактации (в связи с отсутствием данных).

Побочные действия

Желудочно-кишечные расстройства. появление реакций повышенной чувствительности со стороны кожных покровов (сыпь, зуд, крапивница), отек Квинке.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, судороги. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особые указания

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении