Инструкция по применению
Танацехол Таблетки покрытые оболочкой 50 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пижмы обыкновенной цветков экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 60



Описание

Таблетки, покрытые оболочкой светло-желтого цвета, двояковыпуклые, на поперечном разрезе видны два слоя.

Действующее вещество

Пижмы обыкновенной цветков экстракт

Состав

Танацехол 50 мг. Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, аэросил, кальция стеарат. Состав оболочки: сахар, магния гидроксикарбонат, кремния диоксид, желатин, титана диоксид, поливинилпирролидон, воск пчелиный, тропеолин-О.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Взрослым в качестве желчегонного и спазмолитического средства: при хронических некалькулезных холециститах; при дискинезиях желчевыводящих путей по гипермоторному типу; при постхолецистэктомическом синдроме.

Способ применения и дозы

Препарат назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут. Курс лечения - 20-30 дней. Таблетки следует принимать за 15-20 мин до еды.

Противопоказания

желчнокаменная болезнь; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводилось.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов препарата. Лечение: отмена препарата, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно назначение в сочетании с препаратами, применяемыми в гастроэнтерологии (в т.ч. ферменты, антацидные препараты).

Особые указания

По данным клинических исследований Танацехол эффективно купирует симптомы, связанные с нарушением двигательной функции кишечника и желчных путей, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, протекающего с преобладанием запоров, в сочетании с дисфункцией желчного пузыря и протоков.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении